


美洲中國工程師學會短期課程

中醫概論

李宗恩

六經辨證



傷寒論

傷寒論 目錄


辨太陽病脈證并治法	四	小建中湯方	八四
桂枝湯方	十三	大柴胡湯方	八六
桂枝加厚朴杏仁湯	十五	柴胡加芒硝湯方	八八
桂枝加附子湯	十九	桃核承氣湯	九十
桂枝去芍藥湯	二十	柴胡加龍骨牡蠣湯方	九一
桂枝去芍藥加附子湯	二十	桂枝加芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方	九五
桂枝麻黃各半湯	二十二	桂枝加桂湯方	九八
桂枝二麻黃一湯	二十四	桂枝甘草龍骨牡蠣湯方	九九
白虎加人參湯	二十四	辨太陽病脈證并治法下	一〇一
桂枝二越婢一湯	二十六	抵當湯方	一〇五
桂枝去桂加茯苓白朮湯	二十八	抵當丸方	一〇六
甘草乾薑湯	三十	大陷胸丸方	一〇八
芍藥甘草湯	三一	大陷胸湯方	一一〇
調胃承氣湯	三一	小陷胸湯方	一一三
四逆湯	三一	文蛤散方	一一七
葛根湯	三二	白散方	一一九
葛根加半夏湯	三三	柴胡桂枝湯方	一二一
葛根黃芩黃連湯	三六	柴胡桂枝乾薑湯方	一二三
麻黃湯	三七	半夏瀉心湯方	一二五
大青龍湯	三八	治胃瘧湯方	一二六
	四十	十棗湯方	一二八
大黃黃連瀉心湯方	一三〇	豬苓湯方	一七一
附子瀉心湯方	一三二	健胃健脾湯方	一七三
生薑瀉心湯方	一三三	蜜煎導法	一七四
甘草瀉心湯方	一三四	大豬膽汁方	一七四
赤石脂禹餘糧湯方	一三六	茵陳蒿湯方	一七五
旋覆代赭石湯方	一三六	吳茱萸湯方	一七八
桂枝人參湯方	一三七	麻仁丸方	一八〇
瓜蒂散方	一四〇	梔子藥皮湯方	一八四
臟結湯方	一四一	麻黃連軛赤小豆湯方	一八五
黃芩湯方	一四四	辨少陽病脈證并治法	一八七
黃芩加半夏生薑湯方	一四四	辨太陰病脈證并治法	一九二
黃連湯方	一四五	桂枝加芍藥湯方	一九四
桂枝附子湯方	一四六	桂枝加大黃湯方	一九五
桂枝附子去桂加白朮湯	一四六	辨少陰病脈證并治法	一九六
甘草附子湯	一四七	麻黃附子細辛湯方	二〇一
白虎湯	一四八	麻黃附子甘草湯方	二〇二
炙甘草湯方	一四九	黃連阿膠湯方	二〇三
辨陽明病脈證并治法	一五一	附子湯方	二〇四
大承氣湯方	一六一	桃花湯方	二〇五
小承氣湯方	一六二	豬膚湯方	二〇六
調胃承氣湯方	一六二	甘草湯方	二〇六
	一六二	苦酒湯方	二〇七
		半夏散及湯方	二〇七
		白通湯方	二〇八
		白通加豬膽汁湯方	二〇九
		真武湯	二一〇
		通脈四逆湯方	二一一
		四逆散方	二一二
		辨厥陰病脈證并治法	二一五
		烏梅丸方	二一八
		當歸四逆湯方	二二二
		當歸四逆加吳茱萸生薑湯方	二二三
		麻黃升麻湯	二二五
		乾薑黃連黃芩人參湯方	二二六
		白頭翁湯方	二二八

金匱要略

目錄

續傷寒篇	藏府經絡先後病脈證第一
瘧濕渴病脈證治法第二	百合狐惑陰陽毒證治第三
瘧病脈證并治第四	中風歷節病脈并治第五
血痹虛勞病脈并治第六	肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七
奔豚氣病脈證并治第八	胸痹心痛短氣病脈證并治第九
腹滿寒疝宿食病脈證并治第十	五藏風寒積聚病脈證并治第十一
痰飲欬嗽病脈證并治第十二	消渴小便不利淋病脈證治第十三
水氣病脈證并治第十四	黃疸病證并治第十五
驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證第十六	嘔吐噦下利病脈證治第十七
瘡癰腸癰浸淫病脈證治第十八	跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蝨蟲病脈證治第十九
婦人妊娠病脈證治第二十	婦人產後病脈證治第二十一
婦人雜病脈證治第二十二	陰陽易差後勞復第二十三
方劑索引	

六經模型



傷寒論六經提綱

- 「太陽」之為病，脈浮，頭項強痛而惡寒。
- 「陽明」之為病，胃家實是也。
- 「少陽」之為病，口苦、咽乾、目眩也。
- 「太陰」之為病，腹滿而吐，食不下。若下之，必胸下結硬，自利益甚，時腹自痛。
- 「少陰」之為病，脈微細，但欲寐也。
- 「厥陰」之為病，消渴，氣上撞心，心中疼熱，饑而不欲食，食則吐衄。下之，利不止。

辨太陽病脈證並治法上篇

1. 「太陽」之為病，脈浮，頭項強痛而惡寒。
2. 「太陽病」，發熱，汗出，惡風，脈緩者，名為「中風」。
3. 「太陽病」，或已發熱，或未發熱，必惡寒，體痛，嘔逆，脈陰陽俱緊者，名曰：「傷寒」。
4. 「傷寒」一日，「太陽」受之。脈靜者，為不傳也。若脈數急者，為傳也。
5. 「傷寒」二三日，「陽明」、「少陽」證不見者，為不傳也。頗欲吐，若煩躁者，為傳也。
6. 「太陽病」，發熱而渴，不惡寒者，為「溫病」。
7. 若自汗出，身灼熱者，名曰「風溫」。

辨太陽病脈證並治法上篇

8. 「風溫」為病，脈陰陽俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，言語難出。若被下者，直視，失溲；若發汗者，小便不利；若被火者，微發黃色，劇則如驚癎，時瘈瘲；若火薰之，一逆尚引日，再逆促命期。
9. 病有發熱惡寒者，發於「陽」也；無熱惡寒者，發於「陰」也。發於「陽」者七日愈，發於「陰」者六日愈，以陽數七，陰數六，故也。
10. 「太陽病」，頭痛，至七日以上自愈者，以行其經盡故也。若欲作再經者，針「足陽明」，使經不傳則愈。
11. 「太陽病」欲解時，從「巳」至「未」上。
12. 「中風」表解而不了了者，十二日愈。
13. 病人身大熱，反欲近衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也。

辨太陽病脈證並治法上篇

14. 身大寒，反不欲近衣者，寒在皮膚，熱在骨髓也。
15. 「太陽中風」，陽浮而陰弱，陽浮者熱自發，陰弱者汗自出，嗇嗇惡寒，淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴，乾嘔者，「桂枝湯」主之。
16. 「太陽病」，頭痛，發熱，汗出，惡風者，「桂枝湯」主之。
17. 「太陽病」，項背強几几，及汗出，惡風者，「桂枝加葛根湯」主之。
18. 「太陽病」，下之後，其氣上衝者，可與「桂枝湯」，用前法；若不上衝者，不可與之。
19. 「太陽病」三日，已發汗，若吐、若下、若溫針，仍不解者，此為壞病，「桂枝」不中與也。視其脈證，知犯何逆，隨證治之。

辨太陽病脈證並治法上篇

桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮），芍藥三兩，甘草二兩（炙），生薑三兩（切），大棗十二枚（擘）。

右五味，咬咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。服已須臾，啜熱稀粥一升餘，以助藥力。溫覆令一時許，遍身絜絜微似有汗者益佳。不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出，病差，停後服，不必盡劑。若不汗，更服依前法。又不汗，服後小促其間，半日許，令三服盡。若病重者，一日一夜服，周時觀之，服一劑盡，病證猶在者，更作服。若汗不出，乃服至二三劑。禁生冷、粘滑、肉麵、五辛、酒酪、臭惡等物。

辨太陽病脈證並治法上篇

20. 「桂枝湯」本為解肌，若其人脈浮緊，發熱，汗不出者，不可與也。當須識此，勿令誤也。
21. 若酒客病，不可與「桂枝湯」。得湯則嘔，以酒客不喜甘故也。
22. 若喘家，作「桂枝湯」加「厚朴」、「杏子仁」。
23. 凡吐家，服「桂枝湯」，其後必吐膿血也。
24. 「太陽病」，發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者，「桂枝加附子湯」主之。
25. 「太陽病」，下之後，脈促，胸滿者，「桂枝去芍藥湯」主之。若微惡寒者，「桂枝去芍藥方中加附子湯」主之。

辨太陽病脈證並治法上篇

桂枝加葛根湯方：

桂枝三兩（去皮），芍藥三兩，生薑三兩（切），甘草二兩（炙），大棗十二枚（擘），葛根四兩。

右六味，以水七升，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，不須啜粥，餘如桂枝湯將息及禁忌法。

桂枝加附子湯方：

桂枝三兩，芍藥三兩，甘草二兩（炙），生薑三兩，大棗十二枚，附子一枚（炮，去皮，破八片）。

右六味，以水六升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。若一服汗止，停後服。

辨太陽病脈證並治法上篇

26. 「太陽病」，得之八九日，如瘧狀。發熱，惡寒，熱多寒少，其人不嘔，圍便欲自可，一日二三度發。脈微緩者，為欲愈也；脈微而惡寒者，此陰陽俱虛，不可更發汗，更下，更吐也。面色反有熱色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必癢，宜「桂枝麻黃各半湯」。
27. 「太陽病」，初服「桂枝湯」，反煩不解者，先刺「風池」、「風府」，卻與「桂枝湯」則愈。
28. 服「桂枝湯」，不汗出，脈洪大者，與「桂枝湯」如前法。若形如瘧，日再發者，汗出必解，宜「桂枝二麻黃一湯」。
29. 服「桂枝湯」，大汗出後，大煩渴不解，脈洪大者，「白虎加人參湯」主之。

辨太陽病脈證並治法上篇

桂枝去芍藥湯方：

桂枝三兩，甘草二兩（炙），大棗十二枚，生薑三兩。

右四味，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。

桂枝去芍藥加附子湯方：

桂枝三兩，生薑三兩，甘草二兩（炙），大棗十二枚，附子一枚（炮，去皮，破八片）。

右五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。若一服惡寒止，停後服。

桂枝麻黃各半湯方：

桂枝一兩十六銖，芍藥一兩，生薑一兩，甘草一兩，麻黃一兩（去節），大棗四枚，杏仁二十四個（湯浸，去皮尖）。

右七味，以水五升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取一升八合，去滓，溫服六合。

辨太陽病脈證並治法上篇

桂枝二麻黃一湯方：

桂枝一兩十七銖，芍藥一兩六銖，麻黃十六銖（去節），生薑一兩六銖，杏仁二十六個（去皮尖及雙仁），甘草一兩二銖，大棗五枚（擘）。

右七味，以水五升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，去滓，溫服一升，日再服。

白虎加人參湯方：

知母六兩，石膏一斤（碎，綿裹），甘草二兩（炙），粳米六合，人參二兩。

右五味，以水一斗，煮米熟湯成，去滓，溫服一升，日三服。

辨太陽病脈證並治法上篇

30. 「太陽病」，發熱惡寒，熱多寒少，煩躁，脈微弱者，此無陽也，不可發汗，宜「桂枝二越婢一湯」主之。
31. 服「桂枝湯」，或下之，仍頭項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿，微痛，小便不利者，「桂枝去桂加茯苓白朮湯」主之。
32. 「傷寒」，脈浮，自汗出，小便數，心煩，微惡寒，反與「桂枝湯」以攻其表，此誤也。得之便厥，咽中乾，煩躁，吐逆，譫語，腳攣急，作「甘草乾薑湯」與之，以復其陽。若厥愈，足溫者，更作「芍藥甘草湯」與之，其腳得伸。若胃氣不和，譫語者，少與「調胃承氣湯」。

辨太陽病脈證並治法上篇

桂枝二越婢一湯方：

桂枝十八銖（去皮），芍藥十八銖，甘草十八銖，生薑一兩二銖，大棗四枚（擘），麻黃十八銖，石膏二十四銖（碎，綿裹）。

右七味，咬咀，以水五升，煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，去滓，溫服一升。本方當裁為越婢湯、桂枝湯，合飲一升。今合為一方，桂枝二越婢一。

桂枝去桂加茯苓白朮湯方：

芍藥三兩，甘草二兩炙，生薑三兩，茯苓三兩，白朮三兩，大棗十二枚。

右六味，咬咀，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，小便利則愈。

辨太陽病脈證並治法上篇

甘草乾薑湯方：

甘草四兩（炙），乾薑二兩（炮）。

右二味，咬咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服。

芍藥甘草湯方：

白芍藥四兩，甘草四兩（炙）。

右二味，咬咀，以水三升，微火煮取一升半，去滓，分溫再服之。

調胃承氣湯方：

大黃四兩（去皮，清酒洗），甘草二兩（炙），芒硝半斤。

右二味，以水三升，煮取一升，去滓，內芒硝，更上火微煮令沸，少少溫服之。

辨太陽病脈證並治法上篇

33. 若重發汗，復加燒針者，「四逆湯」主之。
34. 問曰：『證象「陽旦」，按法治之而增劇，厥逆，咽中乾，項脛拘急而譫語。師言夜半手足當溫，兩腳當伸。後如師言，何以知此？』答曰：『寸口脈浮而大，浮則為風，大則為虛，風則生溫熱，虛則兩脛攣，病證象「桂枝」，因未加「附子」參其間，增「桂」令汗出，亡陽故也，厥逆，咽中乾，煩躁。「陽明」內結，譫語煩亂。更飲「甘草乾薑湯」，夜半陽氣還，兩足當溫，脛尚微拘急，重與「芍藥甘草湯」，爾乃脛伸，以「承氣湯」微瀉，則止其譫語，故病可愈。』

辨太陽病脈證並治法上篇

四逆湯方：

甘草二兩（炙），乾薑一兩半，附子一枚（生用去皮，破八片）。

右三味，咬咀，以水三升，微火煮取一升二合，去滓，分溫再服。強人可大附子一枚，乾薑三兩。

辨太陽病脈證並治法上篇

35. 「太陽病」，項背強几几，無汗，惡風者，「葛根湯」主之。
36. 「太陽」與「陽明」合病，必自下利，「葛根湯」主之。
37. 「太陽」與「陽明」合病，不但下利，而嘔者，「葛根加半夏湯」主之。
38. 「太陽病」「桂枝證」，醫反下之，利遂不止，脈促，喘而汗出者，表未解也，「葛根黃芩黃連湯」主之。
39. 「太陽病」，頭痛，發熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘者，「麻黃湯」主之。

辨太陽病脈證並治法上篇

葛根湯方：

葛根四兩，麻黃三兩，桂枝二兩（去皮），芍藥二兩，甘草二兩（炙），生薑三兩，大棗十二枚（擘）。

右七味，咬咀，以水一斗，先煮麻黃、葛根，減二升，去沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗，不須啜粥。餘如桂枝湯法將息及禁忌。

葛根加半夏湯方：

葛根四兩，麻黃三兩（湯泡去黃汁，焙乾秤），桂枝二兩，芍藥二兩，甘草二兩（炙），生薑二兩，大棗十二枚（擘），生半夏半升（洗）。

右八味，以水一斗，先煮麻黃、葛根，減二升，去白沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗。

辨太陽病脈證並治法上篇

葛根黃芩黃連湯方：

葛根半斤，甘草二兩（炙），黃芩三兩，黃連三兩。

右四味，以水八升，先煮葛根，減二升，內諸藥，煮取二升。去滓，分溫再服。

麻黃湯方：

麻黃三兩，桂枝二兩（去皮），甘草一兩（炙），杏仁七十個（去皮尖）。

右四味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，覆取微似汗，不需啜粥，餘如桂枝法將息。

辨太陽病脈證並治法上篇

40. 「太陽」與「陽明」合病，喘而胸滿者，不可下，宜「麻黃湯」。
41. 「太陽病」，十日已去，脈浮細而嗜臥者，外已解也。設胸滿，脅痛者，與「小柴胡湯」，脈但浮者，與「麻黃湯」。
42. 「太陽傷寒」，脈浮緊，發熱，惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，「大青龍湯」主之。
43. 若脈微弱，汗出，惡風者，不可服之；服之則厥逆，筋惕肉瞤，此為逆也。
44. 「傷寒」，脈浮緩，身不疼，但重，乍有輕時，無「少陰證」者，「大青龍湯」主之。

辨太陽病脈證並治法上篇

小柴胡湯方：

柴胡半斤，黃芩三兩，人參三兩，甘草三兩，半夏半升（洗），生薑三兩（切），大棗十二枚（擘）。

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，取三升，溫服一升，日三服。

大青龍湯方：

麻黃六兩，桂枝二兩（去皮），甘草二兩（炙），杏仁五十個（去皮尖），生薑二兩（切），大棗十二枚（擘），石膏如雞子大（碎）。

右七味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服八合，取微似汗。汗出多者，溫粉撲之，一服汗者，停後服。

辨太陽病脈證並治法上篇

45. 「傷寒」，表不解，心下有水氣，乾嘔，發熱而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹滿，或喘者，「小青龍湯」主之。
46. 「傷寒」，心下有水氣，咳而微喘，發熱不渴，「小青龍湯」主之。服湯已，渴者，此寒去欲解也。

辨太陽病脈證並治法上篇

小青龍湯方：

麻黃三兩（去節），芍藥三兩，細辛三兩，乾薑三兩，甘草三兩（炙），桂枝三兩，五味子半斤，半夏半升（洗）。

右八味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升。若渴，去半夏，加栝蒌根三兩。若微利，去麻黃，加芫花如雞子大，熬令赤色。若噫者，去麻黃，加附子一枚（炮）。若小便不利，少腹滿者，去麻黃，加茯苓四兩。若喘，去麻黃，加杏仁半升（去皮尖）。